

Brukerrapport

Bruker: Furukollen Psykiatriske Senter

Produkt: HemoCue® WBC DIFF

Utsagn gjengitt med tillatelse

Furukollen Psykiatriske Senter er et aktivitets- og rehabiliteringstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Omtrent halvparten av plassene er for pasienter fra spesialisthelsetjenesten (Helse Sør-Øst), mens resten er kommunale omsorgsplasser – flest fra Oslo kommune.

Totalt er det 65 plasser fordelt på seks bygninger, lokalisert på Årnes.



Hvorfor valgte dere å investere i HemoCue WBC DIFF?

Mange av våre pasienter og beboere bruker Leponex, noe som førte til veldig mange besøk på legekontor, både her på Årnes, men også lenger unna for de som har fastlege andre steder.

Når og hvor ofte bruker dere HemoCue WBC DIFF?

Ved oppstart med Leponex, måles WBC DIFF hyppig og senere minst en gang i måneden. I tillegg måles det ved tegn til infeksjon/feber. Vi har ca. 20 personer som står på Leponex per i dag.

Hvilke fordeler har dere ved å bruke WBC DIFF lokalt på Furukollen?

Det er flere fordeler ved at vi kan ta prøven her på Furukollen. Først og fremst sparer vi mye tid og ressurser på at vi ikke behøver å reise til legekontor for å få tatt prøven.

Det kan også være utfordrende å få med pasienter/beboere, som er dårlige psykisk, til legekontorene.

Hva har bruken av HemoCue WBC DIFF forandret for pasientene og ansatte på Furukollen?

Tid og ressurser de ansatte ellers måtte brukt på å følge pasienter til legekontor, kanskje over en times reise unna, kan nå brukes bedre.

Pasientene opplever prøvetakingen som tryggere da de kjenner personalet på Furukollen godt. En reise til legekontoret er utfordrende fordi de da opplever ukjent helsepersonell og ukjent miljø.

Nevn et konkret eksempel der prøvetaking med HemoCue WBC DIFF har vært viktig å ha lokalt.

Det var ønskelig at en pasient skulle starte med Leponex, men man var usikker på han vil samarbeide om blodprøvetaking, som må tas hyp-

pig i starten. Det at prøven kan tas på Furukollen, nær sagt når som helst på døgnet, gjorde at en oppstart med Leponex ble mulig.

Et annet eksempel er en pasient som står på Leponex, som ble somatisk dårlig med feber, og det hadde vært svært utfordrende å få ham til legekontoret for måling, noe som er viktig nettopp ved feber.

Vi opplever også at alvorlig psykotiske pasienter som ikke klarer å komme seg ut av sengen eller rommet, likevel kan ta blodprøven fordi HemoCue WBC DIFF er portabel.

Hvordan har dere opplevd samarbeidet med Triolab?

Vi har bare hatt gode opplevelser i forhold til samarbeidet med Triolab, og har alltid fått gode råd og rask hjelp når vi har tatt kontakt.

"Pasientene opplever prøvetakingen som tryggere da de kjenner personalet på Furukollen godt."

HemoCue® WBC DIFF



TRIO215-4 101025